**Significato
dell'intervento
nutrizionale in
ambito
riabilitativo nel
paziente con esiti
di frattura di
femore**

**Dott.ssa A. Brusa
Dott.ssa P. Guffanti**

**Casa di Cura
"le terrazze"
Cunardo**

FRATTURA DI FEMORE

Importante causa di morbidità e mortalità in tutte le fasce di età (> nell'anziano)

Pz. anziano

Il 15-20 % dei pazienti con
frattura del terzo prossimale di
femore muore entro il I anno
dall'evento

Fattori predisponenti alla frattura

- ❖ **Malnutrizione**
- ❖ Ridotta attività fisica
- ❖ Ridotta acuità visiva
- ❖ Deficit neurologici
- ❖ Riflessi alterati
- ❖ Disturbi dell'equilibrio

**Più della metà dei pazienti
anziani con frattura di
femore sono malnutriti**

Cause di malnutrizione

- ❖ Ridotto introito nutrienti
- ❖ Aumento fabbisogno nutrienti
- ❖ Aumento perdite nutrienti
- ❖ Alterazioni del metabolismo

Malnutrizione

Deplezione riserve tissutali

Alterazioni funzionali e/o microstrutturali

Alterazioni strutturali macroscopiche

Segni e sintomi clinici

Conseguenze della malnutrizione

Primarie

Secondarie

- ❖ Rid. guarigione ferite
 - ❖ Aumentato rischio di infezione
 - ❖ Rid. Funz. intestinale
 - ❖ Rid. Funz. muscolare
 - ❖ Rid. Risposta ventilatoria
 - ❖ Rid. Risposta immunitaria
- ❖ Aumento morbilità
 - ❖ Aumento mortalità
 - ❖ Aumento impiego farmaci
 - ❖ Aumento durata riabilitazione
 - ❖ Rid. qualità di vita
 - ❖ Aumento costi gestione sanitaria

Effetti della malnutrizione sullo scheletro

Effetti della M. sul tessuto muscolare e adiposo

Muscolo

**Proteolisi
Glicogenolisi**

**Amminoacidi
Glicogeno**

Atrofia muscolare

Tessuto adiposo

Lipolisi

**Acidi grassi liberi
Glicerolo**

**Riduzione della massa
grassa**

OSTEOPOROSI

**IPOTROFIA
DEBOLEZZA MUSCOLARE**

ALTO RISCHIO DI FRATTURA

**RIDUZIONE DEL GRASSO
SOTTOCUTANEO**

L'ASSUNZIONE DI INTEGRATORI ALIMENTARI PROTEICI IN PAZIENTI ANZIANI MALNUTRITI CON FRATTURA DI FEMORE PUO' MIGLIORARE

Mini Nutritional Assessment (MNA)

Individua precocemente il rischio di
malnutrizione

Rapido intervento nutrizionale

MNA

- ❖ **Misurazioni antropometriche:** IMC, peso attuale, perdita di peso, forza muscolare, circonferenza del braccio e del polpaccio.
- ❖ **Anamnesi alimentare:** autonomia, n° pasti consumati, liquidi introdotti
- ❖ **Valutazione complessiva:** decubiti, terapia, autonomia nei movimenti
- ❖ **Valutazione cognitiva**
- ❖ **Esami di laboratorio:** albumina, linfociti tot., transferrinemia

MNA

Punteggio massimo 30 punti

Griglia di valutazione:

< 17 punti: pz.malnutrito

17-23.5 punti: pz. a rischio di m.

24-30 punti: pz. ben nutrito

MNA

Vantaggi

- ❖ Affidabilità
- ❖ Facilità di gestione
- ❖ Non invasiva
- ❖ Basso costo
- ❖ Sensibilità
- ❖ Specificità
- ❖ Valore predittivo

MNA

Svantaggi

- ❖ Paziente non collaborante
- ❖ Difficoltà ad effettuare le misure antropometriche

VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE (Mini Nutritional Assessment MNA)

Valutazione all'ingresso del paziente.

- ❖ **Data:**
- ❖ **Nome.....Cognome.....IMC**
- ❖ **Sesso: M / F Età.....Peso kg.....Altezza cm...
Altezza del ginocchio cm.....**
- ❖ **Diagnosi.....
.....**
- ❖ **Tipo di dieta: Kcal totali / die**
dieta *per os* normale: € dieta speciale: €
NE: € NE + dieta *per os*: € NE + NP: € NP +
dieta *per os*: €NPT: €

Formule di Harris e Benedict per il calcolo rapido della BEE

$$\text{BEE uomo: } 66.4 + 13.7P + 5A - 6.7E$$

$$\text{BEE donna: } 655 + 9.5P + 1.8A - 4.6E$$

P= peso attuale in Kg

A= altezza in cm

E= età in anni

Fattori di correzione del BEE per patologia

Postoperatorio non complicato	1.0 x BEE (normali)
Frattura ossa lunghe	1.15-1.3 x (aumentati)
Cancro	1.1-1.3 x (aumentati)
Peritonite/sepsi	1.1-1.3 x (aumentati)
Infezioni gravi, multitrauma	1.2-1.4 x (elevati)
Multiple organ failure	1.2-1.4 x (elevati)
Ustioni	1.2-2 x (elevati)

Fattori di correzione del BEE per attività fisica

- ❖ Pz. Allettati 1.2
- ❖ Pz. Non allettati 1.3

Kcal / kg / die: BEE_{Ex}F_{ax}F_m

Screening

- ❖ **Perdita dell'appetito?** Ha mangiato meno negli ultimi tre mesi? (perdita d'appetito, problemi digestivi, difficoltà di masticazione o deglutizione)
0 = anoressia grave 1 = anoressia moderata 2 = nessuna anoressia €
- ❖ **Perdita di peso recente (< 3 mesi)**
0 = > 3 kg 1 = non valutabile 2 = $1 \leq \text{kg} \leq 3$ 3 = nessuna perdita €
- ❖ **Motricità**
0 = letto poltrona 1 = autonomo 2 = esce €
- ❖ **Nell'arco degli ultimi tre mesi: malattie acute o stress psicologici?**
0 = si 1 = no €
- ❖ **Problemi neuropsicologici**
0 = stato cognitivo compromesso 1 = stato cognitivo moderatamente compromesso
2 = nessuna compromissione stato cognitivo €
- ❖ **IMC** peso/ (altezza)² in kg/m²
0 = > IMC < 19 1 = $19 \leq \text{IMC} < 21$ 2 = $21 \leq \text{IMC} < 23$ 3 = $\text{IMC} \geq 23$ €

Valutazione dello screening (totale parziale max. 14 punti) €€

12 punti o più

normale

11 punti o meno

possibilità di malnutrizione continuare la valutazione

Valutazione globale

❖ **Prende più 3 medicinali?**

0 = si 1 = no

€

❖ **Presenza di decubiti, ulcere cutanee?**

0 = si 1 = no

€

❖ **Quanti pasti completi (colazione, pranzo, cena, con più di 2 piatti) al dì?**

0 = 1 pasto 1 = 2 pasti 2 = 3 pasti

€

❖ **Come si nutre?**

0 = necessita di assistenza 1 = autonomamente con difficoltà 2 = autonomamente senza difficoltà

€

❖ **Quanti bicchieri beve (acqua, succhi, caffè, tè, latte....) al dì?**

0.0 = < 3 bicchieri 0.5 = da 3 a 5 bicchieri 1.0 = più di 5 bicchieri

€.

❖ **Albumina g/dl :g/dl**

0 = < 2,5 g/dl 1 = $2,5 \leq \text{g/dl} \leq 3,5$ 2 = > 3,5 g/dl

€

❖ **Linfociti totali /mm³: /mm³**

0 = < 900 1 = $800 \leq n/\text{mm}^3 < 1500$ 2 = > 1500

€

❖ **Tranferrinemia m / dl:m / dl**

0 = < 200 1 = < 270 2 = $270 \leq \mu / \text{dl} < 400$

€

- ❖ **Circonferenza brachiale (CB, cm):** **cm**
 0.0 = $CB < 21$ 0.5 = $21 \leq CB \leq 22$ 1.0 = $CB > 22$ €€€
- ❖ **Circonferenza Polpaccio (CP, cm):** cm
 0 = $CP < 31$ 1 = $CP \geq 31$ €
- ❖ **Forza muscolare kg:** kg
 0 = nessuna forza 1 = < 10 kg 2 = > 10 kg €

VALUTAZIONE GLOBALE (max. punti) €€€€
SCREENING €€
VALUTAZIONE TOTALE €€€€

VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE

	Score		
❖	≥ 24	stato nutrizionale normale	€€€€
❖	Da 17 a 23, 5	rischio di malnutrizione	€€€€
❖	Meno 17 punti	malnutrizione	€€€€

SCHEDA RIABILITATIVA (INGRESSO)

NOME COGNOME

DATA:

AVQ:

- ❖ Autonomo
- ❖ Parzialmente autonomo
- ❖ Non autonomo

DEAMBULAZIONE:

- ❖ Sì come
- ❖ No

PUNTEGGIO FIM: /126

PASSAGGI POSTURALI:

- ❖ Autonomo
- ❖ Con l'aiuto di 1 persona
- ❖ Con l'aiuto di due persone
- ❖ Sollevatore

ARTICOLARITA':

- ❖ Arti superiori
- ❖ Arti inferiori

STENIA MUSCOLARE:

- ❖ Arti superiori
- ❖ Arti inferiori

SCHEDA RIABILITATIVA (DIMISSIONE)

NOME COGNOME

DATA:

ARTICOLARITA':

- ❖ Arti superiori: migliorata non migliorata
- ❖ Arti inferiori: migliorata non migliorata

DEAMBULAZIONE:

- ❖ Sì come
- ❖ No

STENIA MUSCOLARE:

- ❖ Arti superiori: migliorata non migliorata
- ❖ Arti inferiori: migliorata non migliorata

PASSAGGI POSTURALI:

- ❖ Autonomo
- ❖ Con l'aiuto di 1 persona
- ❖ Con l'aiuto di due persone
- ❖ Sollevatore

PERCORSO RIABILITATIVO POST-DIMISSIONE:

- ❖ Domicilio
- ❖ ADI
- ❖ RSA
- ❖ Riabilitazione di mantenimento geriatrica
- ❖ Riabilitazione ambulatoriale

AVQ:

- ❖ Autonomo
- ❖ Parzialmente autonomo
- ❖ Non autonomo

PUNTEGGIO FIM: /126

PRESCRIZIONE AUSILI:

CASI CLINICI ORTOPEDICI OSSERVATI

- 11 pazienti (2 uomini, 9 donne)
- Età media: 81 anni (67-91 anni)
- Diagnosi di ingresso: esiti osteosintesi femore
- Valutazione stato nutrizionale con MNA all'ingresso e alla dimissione +scheda riabilitativa

1° VALUTAZIONE NUTRIZIONALE

MALNUTRIZIONE

	Lieve	Moderata	Grave	
Calo ponderale	5 – 10 %	11 – 20 %	> 20 %	
BMI (kg/m ²)	23,8 (15,7-36)	18.4 - 17	16.9 – 16	< 16
Albumina (g/dl)	3.5 – 3.0	2.9 – 2.5	< 2.5	
Transferrina (mg/dl)	200 - 150	149 – 100	< 100	
Linfociti /mm ³	1500 - 1200	1199 - 800	< 800	
CB (cm)	22 - 23	21 - 22	< 21	
CP (cm)	31- 32	30 - 31	< 30	
Forza muscolare kg (hand grip)	10	5	0	

I valutazione nutrizionale

MNA

- Screening
 - >12 normale
 - <11 possibilità di malnutrizione (tutti i pz)

- Valutazione stato nutrizionale
 - >24 normale (1pz)
 - 17 < n° < 23,5 a rischio (8pz)
 - < 17 malnutrizione (2 pz)

Stima dei fabbisogni energetici

$$\underline{\text{Kcal TOTALI} = \text{BEE} \times \text{Fa} \times \text{Fm}}$$

Per le donne

$$\begin{aligned} \text{Kcal} &= (655 + 9,563 \times 63,1 + 1,85 \times 153,3 - 4,67 \times 81,5) \times 1,3 \times 1,3 \\ &= 1962,8 \text{ Kcal} \quad \Rightarrow \quad 31 \text{ Kcal/kg/die} \end{aligned}$$

Per gli uomini

$$\begin{aligned} \text{Kcal} &= (66,47 + 13,75 \times 69 + 5,003 \times 162 - 6,75 \times 79) \times 1,3 \times 1,3 \\ &= 2184,325 \text{ Kcal} \quad \Rightarrow \quad 31,66 \text{ Kcal/kg/die} \end{aligned}$$

Fa Fattore di attività fisica

allettati	1,2
non allettati	1,3

Fm Fattore di malattia

interventi minori	1,2
traumi scheletrici	1,3
infezioni gravi	1,6
ustione grave	2,10

-
- Nessun intervento nutrizionale
 - Incremento dell'introito per os (9 pz)
 - Aggiunta di integratore per os
 - Incremento introito+integratore per os (2 pz)
 - Nutrizione parenterale
 - Sondino naso-gastrico
 - PEG

Monitoraggio

	Ingresso	dimissione
■ Peso corporeo (Kg)	57,11	56,86
■ BMI	23,8	23,7
■ Albumina (g/dl)	2,9	3,3
■ Transferrina (mg/dl)	178	192
■ Linfociti/mm ³	1491	1555
■ CB(cm)	25	25
■ CP(cm)	30	29,8
■ Forza muscolare (hand grip)	0	0
■ Introito calorico(Kcal/Kg/die)	25	30

Parametri bioumorali

■ ingresso ■ dimissione

Parametri antropometrici

■ ingresso ■ dimissione

BMI

circ.brach.

circ. polp.

forza

SCHEDA RIABILITATIVA (INGRESSO)

NOME COGNOME

DATA:

AVQ:

- Autonomo
- Parzialmente autonomo
- Non autonomo

DEAMBULAZIONE:

- Si come
- No

PUNTEGGIO FIM: 75 /126

PASSAGGI POSTURALI:

- Autonomo
- Con l'aiuto di 1 persona
- Con l'aiuto di due persone
- Sollevatore

ARTICOLARITA':

- Arti superiori nella norma
- Arti inferiori ridotta

STENIA MUSCOLARE:

- Arti superiori nella norma
- Arti inferiori ipostenia

...qualcosa di diverso!

“Non darmi né
povertà né ricchezza,
ma fammi avere il
cibo necessario”

Grazie e....buon appetito!